



Quelle place d'avenir pour les légumineuses en Wallonie ? – Gembloux – 8 Novembre 2016

L'intérêt des cultures en association dans un objectif d'autonomie protéique

Journée d'étude sur les légumineuses:
Quelle place d'avenir pour les légumineuses en Wallonie

08 novembre 2016

Ir Pierreux Jérôme

Phytotechnie des Régions Tempérées
Prof. Bernard Bodson

Biologie végétale
Prof. Patrick du Jardin

Unité Fertilité des sols et
Protection des Eaux
Dr. Christian Roisin



Projet financé pour 4 ans par
le Service Public de Wallonie, DGO3

with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016



Pourquoi introduire les cultures de légumineuses récoltées en graines dans nos culture de céréales?

- Sources de protéines végétales
- Apport naturel d'azote
- Accroître la biodiversité de nos écosystèmes « grandes cultures »
- Alternative et diversification des rotations



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016





La culture en association

- 2009→2012 : essais exploratoires
- 2012< : Projet DGA



Produire durablement des graines riches en protéines en optimisant la conduite de la culture associée de pois protéagineux d'hiver et de froment d'hiver

Phytotechnie des Régions
Tempérées
Prof. Bernard Bodson

Biologie végétale
Prof. Patrick du Jardin

Unité Fertilité des sols et
Protection des Eaux
Dr. Christian Roisin

Projet financé pour 4 ans par
le Service Public de Wallonie, DGO3

with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016



Objectif

Optimiser les modalités culturales de **l'association pois d'hiver-blé d'hiver** pour assurer une **production fiable** d'une quantité de matière sèche au moins **équivalente à celle produite par les deux cultures pures** en améliorant le rendement en protéines tout en **réduisant les apports d'engrais azotés de synthèse** nécessaires à cette production.



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016





L'orientation de nos recherches

- Axe 1 : Structure de végétation
 - Densité de semis
→ 4 densités X 2 variétés de pois et 2 variétés de froment
 - Choix variétal
Importance du **couple** froment-pois
→ 6 variétés de pois X 6 variétés de Froment
- Axe 2 : Nutrition azotée
 - Développement des nodosités
 - Structure de végétation
→ 4 variétés X 9 fumures

with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016



4 ans de résultats...

- Développement végétatif et récolte attrayante
 - Quantitatif (\approx culture pure de froment)
 - Qualitatif (\approx culture pure de pois)
- Sécurité de récolte (ex: grêle 2014, récolte pois 2016)



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016





20 mai 2014

Dégâts importants engendrés aux cultures

→ Impossibilité de récolter les cultures pures de pois

→ Récolte des cultures associées



20 mai 2014



21 mai 2014



Dégâts de verse récolte 2016



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016




Réussir la culture associée : Développement végétatif

Indice CGR (Crop growth rate) :

>1 → le froment a une croissance relative supérieure à celle du pois

<1 → le pois a une croissance relative supérieure à celle du froment



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016




Réussir la culture associée : Développement végétatif

Biomasse aérienne de
l'association

>

Biomasse aérienne de
cultures pures selon les
mêmes proportions



Biomasse totale observée:


Addition des biomasses par hectare de pois et de froment recensées au sein de l'association

Biomasse totale théorique:

$$\frac{\text{Biomasse pois pur/ha} + \text{Biomasse blé pur/ha}}{2}$$

Réussir la culture associée : Nutrition azotée

**Biomasse aérienne Epsom Ivernel essai
fumure 10 juin 2013**




Biomasse blé:

Intérêt d'un apport azoté au stade fin tallage
début redressement

Le froment montre des besoins en azote en début de végétation


Biomasse pois:

Pas d'influence significative de la fumure



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016


Réussir la culture associée : Nutrition azotée



Fumure 0 N montre des performances attrayante.

!!!! À gérer les dominances interspécifique et risques d'accident culturaux qui peuvent en découler (verse)!!!

Réussir la culture associée : Nutrition azotée



Fumure 0 N montre des performances appréciable


!!!! À gérer les dominances interspécifique et risques d'accident culturaux qui peuvent en découler (verse)!!!

Intérêt de la fraction tallage-redressement pour le développement du blé et l'optimisation de la récolte

with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016



Réussir la culture associée : Nutrition azotée



La fumure permet une gestion des proportions de chaque espèce lors de la récolte

Importance selon les débouchés de la récolte

Intérêt de la fraction tallage-redressement pour le développement du blé et l'optimisation de la récolte

Peu d'impact des plus grosses fumures sur les performances de l'association

Qualité des grains récoltés


Récolte 2013

				Fum 1	Fum 2	Fum 3	Fum 5	Fum 4	Fum8	Fum 6	Fum 7	Fum 9
				0-0	0-40	40-40	40-80	0-80	80-80	0-120	40-120	0-160
Edgar spencer	Assoc	FH	MPT/MS (%)	14,5	14,5	13,9	14,8	15,4	14,8	15,4	15,0	15,7
			Zel (ml)	49,0	49,0	49,0	50,0	54,0	52,0	49,0	51,0	53,0
			Z/P	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,2	3,4	3,4
		Pois	MPT/MS (%)	21,3	21,7	22,2	21,9	21,9	22,0	22,0	21,9	22,2
	Pur	FH	MPT/MS (%)	9,7	10,7	10,9	11,8	12,0	12,5	13,1	12,1	13,9
			Zel (ml)	26,0	33,0	33,0	37,0	38,0	44,0	46,0	37,0	50,0
			Z/P	2,7	3,1	3,0	3,1	3,2	3,5	3,5	3,1	3,6
		Pois	MPT/MS (%)	24,5	24,5	24,2	23,6	24,0	23,8	24,7	24,3	24,4

La fumure **40-40** = optimisation de la **quantité** de froment à la récolte

Mais l'optimisation de la **qualité** du grain de froment = fumure **40-80**

La fumure DF est fonction du potentiel de rendement du froment






Qualité des grains récoltés

Bonification:

Protéines, Zélény, Gluten index, dureté

→ Qualité boulangère



with the technical cooperation of the International Year of Pulses 2016





Conclusions générales provisoires

Objectifs du projet : assurer une production fiable d'une quantité de matière sèche au moins équivalente à celle produite par les deux cultures pures en améliorant le rendement en protéine.

L'association froment et pois d'hiver permet un développement végétatif et une récolte particulièrement intéressante.

Ces résultats seront confirmés et complétés par les prochaines expérimentations et en particulier pour les thèmes suivants:

- Choix variétal
- Désherbage de l'association
- Développement en grande culture (semis,...)
- Débouchés de la récolte

variétés de pois sensibles à la photopériode ex: Spencer

Merci de votre attention

