

## Cultures dérobées

### ✓ Semis


Espèces pures	Dose de semis (kg/ha)	Mélanges	Dose de semis (kg/ha)
Ray-grass d'Italie (RGI)	30	RGI + TA	20+10
Avoine blanche (Av BI)	100	Av BI + PF	80+25
Avoine Brésilienne (AV Br)	40	Av Br + TA	20+10
Seigle Multicaule (SM)	40	SM + VC	20+20
Vesce Commune (VC)*		Av BI + VC	80+20
Trèfle d'Alexandrie (TA)*			
Pois Fourrager (PF)*			

\* Non semé en pur

### → conseils :

- Semer tôt (15/06 – 15/08)
- Retour de la pluie
- Associer légumineuse(s)
- Espèces fonction sol/climat, date de récolte, rotation, ...

### ✓ Production




### → conseils :

- Optimum = compromis entre rendement et qualité (énergie, protéine, digestibilité)
- 65 à 80 jours entre semis et récolte (suivant espèces)
- Légumineuses = qualité ↗ (trèfles, pois ou vesce)
- Avoine brésilienne + tardive et + saine
- Seigle, Tr. Incarnat → coupe de printemps

### ✓ Qualité

Production d'énergie et de protéines par ha



### ✓ Reliquat

Reliquat azoté en novembre

