

1. Cécidomyie du Gleditsia



On observe actuellement le premier vol de Cécidomyie du Gleditsia et quelques dégâts.
Traitez avec Movento par temps poussant et sur végétation développée.

MOVENTO (75 ml / 100 l)

Système double

Appliquer avec beaucoup d'eau (1000 l d'eau/ha)

Ne rien ajouter à Movento pour qu'il pénètre vraiment au maximum dans la plante.

Movento ne peut être appliqué que 2 fois par an sur les mêmes plantes, cela pour éviter l'apparition de résistance.

Ne l'appliquez pas maintenant sur d'autres plantes si ce n'est pas nécessaire.

2. Bouleau : Tenthrede mineuse

Les nouvelles feuilles ne présentent pas de dégât mais on observe encore ça et là des adultes de tenthrède mineuse.

Si vous avez traité lors de l'avertissement du 24 mai, répétez une seconde fois le traitement, avec Calypso. Si vous ne l'avez pas fait le 24 mai, faites-le au plus vite.

La population de pucerons du bouleau est nettement diminuée. En principe il n'est plus nécessaire d'ajouter Pirimor ou Teppeki. Mais vérifiez quand même vos parcelles.



Tenthredine mineuse du bouleau (adulte – dégâts)

CALYPSO (25 ml / 100 l) – seul agréé contre tenthredine en pépinière

Systémique, agit par contact et ingestion

Apporter suffisamment d'eau (800 à 1000 l/ha)

Temps calme, temps poussant

Maximum 2 applications / an sur la même culture

Produit classé orange : sélectivité moyenne à bonne vis-à-vis des auxiliaires et des pollinisateurs

TEPPEKI (14g / 100l)

Systémique et translaminaire, agit par contact et ingestion

Apporter suffisamment d'eau : bien mouiller l'entière des arbres (800 à 1000 l /ha)

PIRIMOR (50g / 100l) – si T° > 18°C le jour du traitement et les jours suivants

Contact et translaminaire, agit par contact, ingestion et inhalation

Apporter suffisamment d'eau : bien mouiller l'entière des arbres

3. Acariens : restez vigilants et intervenez avant que le feuillage ne jaunisse trop

Sur tilleul, charme, sorbier, érable : acariens (tétranyques)

Il est déconseillé de mélanger ces acaricides à un fongicide. Par contre vous pouvez y ajouter urée et sulfate de magnésie pour bien faire verdifier le feuillage et l'endurcir

MASAI 20 WP – (tebufenpyrad)

Contact : sur plante sèche

50g/100 l d'eau

Code orange

ou



ACARAMIK, AGRIMEC, VERTIMEC (abamectine) – contre acarien du tilleul et du charme

Translaminaire, agit par contact et ingestion

Traiter tôt le matin ou le soir

25 ml/100l d'eau ;

Code rouge

Observations : F.Faux, S. Galland CEHW (2) – C.Fassotte, M.Tomme CRA-W(1)

Rédaction et diffusion: CEHW

(1). **Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)**, Département Sciences du Vivant, Unité Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/ 62 56 84; courriel : fassotte@cra.wallonie.be).

(2). **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60; courriel : cehw@cehw.be).