

## 1. Psylle sur pommier (*Psylla mali*) et poirier (*Cacopsylla pyri* É fiche bleue 3.1.2.)

On observa actuellement une attaque importante de psylle sur scions et jeunes baliveaux de pommiers et de poiriers. Il se trouve au stade larvaire. Il est visible à l'œil nu, allongé, vert et se déplace rapidement. Le psylle peut transmettre certains phytoplasmes comme l'Apple Prolifération ou le Pear Decline. Pour cette raison il est utile de traiter.



**Movento :** (spirotetramate 100 g/l)

**75 ml / 100l**

Double systémique

A utiliser seul pour un maximum d'absorption et donc d'efficacité

Agit après quelques jours

Un second traitement dans 10 à 14 jours sera probablement nécessaire.

Code vert

## 2. Engrais foliaire

Les cerisiers, mirabelles, tilleuls, pommiers également présentent des symptômes de carence notamment en magnésie.

### **Rappel des doses:**

Les doses par temps chaud sont : 4 kg / ha pour sulfate de magnésie

Les doses par temps couvert : 6 kg / ha pour sulfate de magnésie

Ne pas mélanger au Movento pour ne pas limiter son effet.

Observations ravageurs: C. Fassotte & M.R. Bolen & M. Tomme CRA-W (2) . F.Faux & S.Galland CEHW (1)

Suivi maladies, conseils fumure, rédaction et diffusion: F.Faux CEHW (1)

(1) **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel : francoisefaux@cehw.be).

(2) **Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W)**, Département Sciences du Vivant, Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be)