

1. Bouleau : Puceron et tenthrède mineuse

Sur certaines parcelles, on observe des attaques importantes de **puceron du bouleau pubescent** (*Euceraphis punctipennis*) et de **tenthrede mineuse du bouleau** (*Fenusa pumila*)

Vérifiez vos parcelles et dès que la météo le permet **traitez avec Teppeki ou Pirimor (contre pucerons) + Calypso (contre tenthrède)**

TEPPEKI (14g / 100l) – particulièrement adapté aux conditions météo actuelles:

Systémique et translaminaire, agit par contact et ingestion

Apporter **suffisamment d'eau** : bien mouiller l'entièreté des arbres (800 à 1000 l /ha)

Efficace si 3 heures sans pluie après l'application

Temps calme: pas de vent, pas de pluie, journée ensoleillée si possible !

Efficacité peu dépendante de la t°, de l'humidité et du pH de l'eau

Longue durée d'action: 30 jours

Produit classé vert : pas toxique pour les pollinisateurs – effet neutre sur les auxiliaires

Ne pas mélanger avec du sulfate de magnésie

Maximum 3 applications / an sur la même culture

ou PIRIMOR (50g / 100l) – si T° > 18°C le jour du traitement et les jours suivants

Contact et translaminaire, agit par contact, ingestion et inhalation

Apporter **suffisamment d'eau** : bien mouiller l'entièreté des arbres

Temps calme: pas de vent, pas de pluie, journée ensoleillée si possible !

Maximum 2 applications / an sur la même culture

Produit classé rouge: peu sélectif vis-à-vis des auxiliaires et des pollinisateurs

+ CALYPSO (25 ml / 100 l) – seul agréé contre tenthrède en pépinière

Systémique, agit par contact et ingestion

Apporter **suffisamment d'eau** (800 à 1000 l/ha)

Temps calme, temps poussant

Maximum 2 applications / an sur la même culture

Produit classé orange : sélectivité moyenne à

bonne vis-à-vis des auxiliaires et des pollinisateurs



Dégâts de tenthrède mineuse
du bouleau



Adulte de tenthrède mineuse du bouleau

2. Marronnier: Mineuse

Premier vol important de la mineuse du marronnier (*Cameraria ohridella*).

Dès que la météo le permet **traitez tous vos marronniers avec Dimilin**

DIMILIN (60 ml / 100 l)

Contact, agit par contact et ingestion sur œufs et larves

Produit classé vert: bonne sélectivité vis-à-vis des auxiliaires

+ BAYCOR (60 ml / 100 l) ou HORIZON (50 ml / 100 l)

contre le **champignon Guignardia aesculi**

Baycor : préventif – Horizon : curatif si début d'attaque

3. Pommier, poirier, cerisier : Cheimatobie : Dimilin aussi

En même temps que vos marronniers vous pouvez faire également vos pommiers, poiriers, cerisiers contre la cheimatobie (petite chenille verte qui mange les feuilles).

Si vous avez ajouté Horizon au Dimilin pour vos marronniers ce sera aussi préventif tavelure et moniliose sur pommier, poirier, cerisier donc c'est OK.

Traitez aussi, surtout vos jeunes greffes.

DIMILIN (60 ml / 100 l)



Au stade auquel se trouve la cheimatobie, vous pouvez aussi utiliser un produit biologique Xentari WG

XENTARI WG (75 à 100 g / 100 l)

Contact, agit par ingestion : bactéries qui tuent la chenille


Produit classé blanc

4. Rappel: Poirier: Phytopte et oïdium

Phytopte du poirier, *Eriophyes pyri*



Oïdium du poirier



Un premier avis a été envoyé le 12/04/12

Un second traitement est nécessaire

Rappel:

- Soufre 300 g / 100 l (phytopte)
- Auquel vous ajoutez:
 - si pas de présence d'oïdium: uniquement Flint (10 g / 100 l) ou Ortiva ou Amistar (100 ml/100 l pour les 2)
 - si présence d'oïdium: couper les parties atteintes (à cette époque vous savez le faire à la main, ça va vite; en même temps, dégagez la tête pour qu'elle soit bien aérée et que le produit l'atteigne bien; ça évitera beaucoup de problème si vous supprimez le foyer de la maladie avant de traiter) ;
quand vous avez coupé, traitez avec Exact (400 ml/100l) ou Horizon (50 ml/100l)

5. Zeuzère

Sur beaucoup d'espèces

Plusieurs d'entre vous on vu des dégâts lors des arrachages.

Actuellement arrachez et brûlez les plantes ou parties de plantes atteintes.

Pour cette saison, prévoir des pièges à phéromones.

Certains en ont déjà commandés. Si vous en voulez dites le moi au plus vite, je vais faire une nouvelle commande prochainement. **Ces pièges seront à placer fin mai. Je vous le dirai au moment voulu mais il faut les commander maintenant.**



Larve de zeuzère dans la branche



Piège à phéromones



Zeuzère adulte



Capsule de phéromones suspendue dans le piège

Piège à phéromones : 7,00 € / pièce

Capsules de phéromones pour la saison : 8,80 € / piège

Prix hors TVA

Observations : F.Faux, S. Galland CEHW (2) – C.Fassotte, M.Tomme CRA-W(1)

Rédaction et diffusion: CEHW

(1). Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Département Sciences du Vivant, Unité Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/ 62 56 84; courriel : fassotte@cra.wallonie.be).

(2). **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60; courriel : cehw@cehw.be).