

1. Charançons sur jeunes greffes et jeunes scions (fiche bleu 1.3.1. et 1.3.2.)

Les charançons s'attaquent à beaucoup d'espèces : pommier, poirier, prunier, sorbier, amélanchier, érable, tilleul, bouleau, charme, hêtre,...

C'est surtout sur les **jeunes greffes ou les jeunes scions que les dégâts peuvent être très importants** et fortement retarder le départ de vos greffes.

C'est surtout *Phyllobius oblongus* (brun) qu'on observe actuellement

Traitez dès que possible, de préférence en période un peu ensoleillée pour qu'ils sortent et ainsi soient atteints par le produit.

Calypso (thiacloprid 480 g/l)

25 ml / 100 l – Systémique – agit par contact et par ingestion

Code orange

Uniquement en cas de très forte attaque:

Decis (deltaméthrine 25 g/l) **120 ml / 100 l**

ou Karate (lambda cyhalothrine 100 g/l) **10 ml / 100 l**

Code rouge – Produits de **contact** – agissent par contact et par ingestion



2. Bouleau : Tenthrède mineuse et pucerons (fiche bleu 4.1.2.)

Teppeki (flonicamide 50%)

14g / 100 l – contre pucerons

Systémique et translaminaire, agit par contact et ingestion

Code vert : pas toxique pour les pollinisateurs – effet neutre sur les auxiliaires

Ne pas mélanger avec du sulfate de magnésie

Maximum 3 applications / an sur la même culture

+ Calypso (thiacloprid 480 g/l)

25 ml / 100 l – seul agréé contre tenthrède en pépinière



3. Pucerons en général et Puceron des feuilles de hêtre : *Phyllaphis fagi* (fiche bleu 3.2.1.)

Outre sur les bouleaux, on observe actuellement des attaques de pucerons sur *Acer*, *Fagus*, *Malus*, *Prunus*, *Pyrus*. L'importance de l'attaque est variable d'une parcelle à une autre. Vérifiez vos cultures et si nécessaire traitez.

Teppeki (flonicamide 50%) - **14 g/100 l** – systémique et translaminaire – code vert

ou **Movento** (spirotetramate 100 g/l) - **75 ml/100 l** – double systémie – code vert

Ou **Gazelle** (acetamipride 20%) - **25 g/100 l** – systémique et translaminaire – code orange

Début d'attaque du puceron laineux des feuilles de hêtre :
pas encore impératif d'intervenir mais à surveiller.

Traitement identique à celui des pucerons en général




4. Phytopte du poirier (Erinose du poirier – *Eryophyes pyri*) (fiche rouge 2.2.1.)

Traitement préventif au soufre

Soufre mouillable 80% : 300 g / 100 l

Erinose du poirier : Dégâts sur jeunes feuilles



5. Acariens (Tetranyques) sur Acer, Tilia, Malus, Pyrus et Sorbus (fiche rouge 1.1.1.)

Acaramik, Agrimec, Vertimec (abamectine 18 g/l)

25 ml / 100l d'eau

Translaminare, agit par contact et ingestion

Traiter tôt le matin ou le soir

Code rouge

Ou Envidor (spirodiclofen 240 g/l)

40 ml / 100 l

Contact – agit par contact et par ingestion

Contre tétranyques, phytoptes et action aussi contre le psylle (fiche bleu 3.1.2.) qui commence à être présent sur Pyrus !

Code orange

Traitez maintenant contre la première génération de tétranyques permet d'éviter des problèmes importants durant l'été, lorsque tous les stades sont présents.

Observations ravageurs: C. Fassotte - M. Tomme CRA-W (2) – F.Faux - S.Galland CEHW (1)

Suivi maladies, conseils fumure, rédaction et diffusion: F.Faux –CEHW (1)

(1) **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel : francoisefaux@cehw.be).

(2) **Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W)**, Département Sciences du Vivant, Unité de Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be)