

1. Bouleau : Tenthrède mineuse et pucerons (fiche bleu 4.1.2.)

TEPPEKI (flonicamide 50%)
14g / 100 l – contre pucerons

Systémique et translaminaire, agit par contact et ingestion
Apporter **suffisamment d'eau** : bien mouiller l'entière des arbres (800 à 1000 l /ha)
Efficace si 3 heures sans pluie après l'application
Temps calme: pas de vent, pas de pluie, journée ensoleillée si possible !
Efficacité peu dépendante de la t°, de l'humidité et du pH de l'eau
Longue durée d'action: 30 jours
Code vert : pas toxique pour les pollinisateurs – effet neutre sur les auxiliaires
Ne pas mélanger avec du sulfate de magnésie
Maximum 3 applications / an sur la même culture

+ CALYPSO (thiacloprid 480 g/l)
25 ml / 100 l – seul agréé contre tenthrède en pépinière

Systémique, agit par contact et ingestion
Apporter **suffisamment d'eau** (800 à 1000 l/ha)
Temps calme, temps poussant
Maximum 2 applications / an sur la même culture
Produit classé orange : sélectivité moyenne à bonne vis-à-vis des auxiliaires et des pollinisateurs
Code orange



Dégâts de Tenthrède mineuse sur bouleau

2. Phytopte du poirier (Erinose du poirier) (fiche rouge 2.2.1.)

Traitement préventif au soufre dès le débourrement des bourgeons

SOUFRE MOUILLABLE : 3kg / ha



Erinose du poirier : Dégâts sur jeunes feuilles

3. Acariens (Tetranyques) sur Acer, Tilia, Malus, Pyrus et Sorbus (fiche rouge 1.1.1.)

ACARAMIK, AGRIMEC, VERTIMEC (abamectine 18 g/l)
25 ml/100l d'eau

Translaminaire, agit par contact et ingestion
Traiter tôt le matin ou le soir
Code rouge

**Ou ENVIDOR (spirodiclofen 240 g/l)
40 ml / 100 l**

Contact – agit par contact et par ingestion
Contre tétranyques, phytoptes et action aussi contre le psylle (fiche bleu 3.1.2.) qui commence à être présent sur Pyrus !
Code orange

Traitez maintenant contre la première génération de tétranyques permet d'éviter des problèmes importants durant l'été, lorsque tous les stades sont présents.

4. Traitement préventif contre l'oïdium sur Pyrus ! , Malus, Amelanchier

Flint : strobilurine de **contact** et translaminaire – 10 g / 100 l

Ou Ortiva ou Amistar : strobilurine **systémique** et translaminaire – 100 ml / 100 l

En résumé :

1) Teppeki + Calypso : pour traiter les bouleaux

2) Acaramik ou Vertimec ou Envidor : pour traiter les Acer, Tilia et Sorbus

A cela vous ajoutez Flint ou Ortiva ou Amistar et vous traitez les Malus, Pyrus et Amelanchier

Pas encore nécessaire de traiter les Acer contre l'oïdium donc ajoutez la strobilurine uniquement pour Malus, Pyrus et Amelanchier

Observations : F.Faux CEHW
Rédaction et diffusion: CEHW

Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW), chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel : francoisefaux@cehw.be).