

1. **Puceron noir du cerisier - *Myzus cerasi* (fiche bleue 3.2.4) et puceron des feuilles de hêtre - *Phyllaphis faqi* (fiche bleue 3.2.1.)**



Teppeki : 14 g / 100 l – systémique et translaminaire – code vert

Ou

Movento : 75 ml / 100 l – systémie double – code vert

Maximum 2 applications / an pour éviter les résistances

2. **Rappel : Cécidomyie du *Gleditsia* – *Dasineura gleditschiae* (fiche bleue 2.1.1.)**



Si la végétation est déjà relativement développée, traitez avec Movento par temps poussant.

Si la végétation es encore limitée, traitez avec Decis.

Si la végétation est faible et les dégâts faibles, mieux vaut attendre et traitez plus tard avec Movento.

MOVENTO (75 ml / 100 l)

Systémie double

Appliquer avec beaucoup d'eau (1000 l d'eau/ha)

Ne rien ajouter à Movento pour qu'il pénètre vraiment au maximum dans la plante.

Observations ravageurs: M. Tomme CRA-W (2) – F.Faux CEHW (1)

Suivi maladies, conseils fumure, rédaction et diffusion: F.Faux CEHW (1)

(1) **Centre d'Essais Horticoles de Wallonie (CEHW)**, chemin des serres 14, 7802 Ormeignies (tél : 068/ 28 11 60 ; courriel : francoisefaux@cehw.be).

(2) **Centre de Recherches Agronomiques (CRA-W)**, Département Sciences du Vivant, Unité de Protection des Plantes et Ecotoxicologie, chemin de Liroux 2, 5030 Gembloux (tél : 081/62 56 84 ; courriel : fassotte@cra.wallonie.be)