



## Cynips de l'érable (Hyménoptère de la famille des Cynipidae, *Pediaspis aceris*)

<p><i>Symptômes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apparition de galles sphériques rouges de la taille d'une groseille, à la face inférieure des feuilles d'érable, qui contiennent une larve blanche de cynips ;</li> <li>- Si des galles verdâtres et irrégulières sont observées, il s'agit de galles de cynips qui ont été parasitées par un autre insecte. Ce parasite secondaire a pondu ses œufs dans la galle du cynips après l'avoir tué ;</li> <li>- Des galles brunes peuvent aussi être observées sur les jeunes racines des érables, permettant à des larves de passer l'hiver.</li> </ul>
<p><i>Dégâts</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déformation des feuilles ;</li> <li>- Chute prématurée du feuillage ;</li> <li>- Ralentissement de la croissance.</li> </ul>
<p><i>Période d'observation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuillage : d'avril à octobre ;</li> <li>- Racine : les galles (avec larve ou vides) sont visibles toute l'année.</li> </ul>



Jeunes galles de cynips encore peu colorées à la face inférieure d'une feuille



Galles rouges de cynips à la face inférieure d'une feuille



Galles vertes et irrégulières de cynips parasitées par un autre insecte



Galles brunes de cynips sur racine