

Tenthredes (Hyménoptères de la famille des Tenthredinidae)

<i>Hôtes principaux</i>	<ul style="list-style-type: none"> - De nombreux feuillus ; - Fréquents sur aulnes, saules, frêne et noisetier ; - Chaque espèce est cependant assez spécifique d'une essence particulière.
<i>Symptômes</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perforations et morsures dans le feuillage ; - Squelettisation des pousses terminales ; - Présence de la larve (une fausse-chenille) sur le limbe foliaire ; - Parfois formation d'une galle autour de cette larve (chez les saules).
<i>Dégâts</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Défoliation parfois très importante de l'arbre ; - Perturbation de l'activité photosynthétique et perte de croissance ; - Risque de dépérissement chez les jeunes plants sévèrement touchés.
<i>Période d'observation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Feuillage : de mai à octobre.



Larve de tenthrede (*Eriocampa ovata*) sur feuille d'aulne glutineux



Galles de tenthrede (*Pontania* sp.) sur feuille de saule blanc



Morsures linéaires réalisées par des tenthredes sur feuille d'aulne glutineux



Larves de tenthrede (*Pristiphora testacea*) sur feuille de saule blanc