



## Le topping, une pratique utile pour valoriser l'herbe en prairie

### En quoi ça consiste ?

Le **topping** consiste à faucher toute l'herbe d'une parcelle **avant l'entrée des vaches** : l'idée est d'intervenir environ 24h avant. Cette pratique a pour but d'**anticiper le refus des animaux** sur les zones de bouses, tout en gérant l'épiaison des graminées. Le topping a pour effet de préfaner les plantes et d'ainsi améliorer l'appétence des zones de refus. Les animaux viennent à **augmenter leur ingestion de matière sèche** et à consommer la quasi-totalité de la biomasse disponible.

### Quand l'appliquer ?

Cette technique trouve sa place en début de période sèche, si à la sortie des vaches les refus n'ont pas été touchés, que les anciennes zones de bouses commencent à se putréfier et que les épis commencent à apparaître au niveau des refus.

| <b>Atouts</b>   | <b>Faiblesses</b>   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Augmentation de l'ingestion d'herbe de la prairie</li><li>- Augmentation de la production de la prairie (via la remise en croissance des zones de refus)</li><li>- Diminution du surpâturage entre les zones de refus</li><li>- Dynamique de pousse homogène</li><li>- Limitation de l'ingestion de parasites</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Augmentation du coût de la tonne de matière sèche d'herbe</li><li>- Charge de travail additionnelle</li></ul> |

### Références bibliographiques

Bargain V., « Nous optimisons le pâturage avec du topping », *Réussir lait*, 2019.

Dargon T., « Pâturage : le topping facilite la gestion des paddocks », *Paysan breton*, 2017.

Pâturesens, « Gérer ses excédents pour aborder l'été plus sereinement », *Terre-net Média*, 2019.

Contact : Adeline Lefèvre,  
ad.lefevre@cra.wallonie.be

