

FICHE SYSTÈMES N°3


ELEVAGE BOVINS MIXTE

CHIFFRES CLÉS


Nombre d'exploitations



Répartition sur nos régions




Répartition par versant



Critères descriptifs

Chiffre moyen (min-max)



- ▶ **Unité de Main-d'Oeuvre :**
1,9 UMO (1,5 - 1,6 UMO)
- ▶ **Bio/conventionnel :**
4 % (0,7 - 10,2 %)
- ▶ **Surface Agricole Utile (SAU) :**
105 ha (37 - 209 ha)
- ▶ **Surface fourragère principale (SFP)/SAU :**
78 % (71 - 85 %)
- ▶ **Prairies permanentes/SAU :**
52 % (44 - 62 %)
- ▶ **Taille du troupeau :**
142 Unité Gros Bétail (66 - 217 UGB)
- ▶ **Chargement :**
2,1 UGB/ha SFP (1,8 - 2,4 UGB/ha SFP)
- ▶ **Nombre de vaches laitières :**
39 VL (29 - 54 VL)
- ▶ **Production laitière :**
8 050 L/vache/an (6 824 L - 8 577 L)

DIFFÉRENCES RÉGIONALES




Taille des exploitations



- Une plus grande superficie agricole est observée en France, avec la moyenne la plus élevée dans le Grand Est.

La taille des troupeaux bovins est plus importante dans les Hauts-de-France



Production



- Niveaux de production de lait sont similaires pour les régions flamandes et françaises
- En France et en Flandre, le développement d'exploitations mixtes a été important sous la période des quotas laitiers en solution à l'impossibilité de développer les ateliers lait.

Depuis la fin des quotas en 2015, la tendance est à l'augmentation des cheptels laitiers et à la réduction voir disparition des ateliers d'engraissement.



Agriculture biologique



- Plus élevée en Wallonie, avec 10,2%.



AVIS DES EXPERTS

Il y a 2 types de profil pour les exploitations mixtes bovin lait et bovin viande.

1

En premier la présence d'un atelier d'engraissement des mâles issus du troupeau laitier parfois complété d'achat extérieur d'animaux. Cet atelier supplémentaire permet de valoriser les animaux de l'exploitation. En France, ils sont produits en boeufs quand il y a des surfaces en herbe disponible à valoriser ou sinon en taurillons pour valoriser du maïs ou des pulpes surpressées.

2

Le deuxième profil est un troupeau allaitant (naisseur) avec ou sans engraissement des mâles. En Belgique, c'est le système le plus souvent rencontré. En Hauts-de-France 37% des fermes laitières ont aussi un atelier viande. On retrouve le plus souvent ce système dans les zones les plus herbagères. En Wallonie, 22 % du cheptel bovin se trouvent dans des exploitations mixtes. En Flandre, les exploitations mixtes disparaissent en grande partie ; parfois, les exploitations laitières conservent encore un tout petit troupeau de vaches allaitantes à côté de leur plus grand troupeau laitier.



IMPACT DU CLIMAT SUR CE SYSTÈME

Le changement climatique influence les exploitations mixtes à 2 niveaux: les animaux et les fourrages ou cultures.



Le changement climatique influence les exploitations mixtes à 2 niveaux: les animaux et les fourrages ou cultures. Les mêmes impacts se retrouveront pour les systèmes spécialisés lait ou viande. Avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules en période d'été, les animaux subissent de plus en plus souvent des périodes de stress thermique.

Le **stress thermique** entraîne une diminution d'ingestion d'aliments, une croissance plus lente, une baisse de fertilité et une réduction de la production de viande ou de lait. L'impact sur les animaux peut se manifester tant en bâtiment qu'en pâturage. Ainsi, les conditions d'ambiance dans le bâtiment ou la présence d'ombre en pâture seront des facteurs aggravants ou améliorateurs. L'impact sur les animaux peut se manifester tant en bâtiment qu'en pâturage.

Ainsi, **les conditions d'ambiance dans le bâtiment ou la présence d'ombre en pâture seront des facteurs aggravants ou améliorateurs.** L'impact sur les animaux peut se manifester tant en bâtiment qu'en pâturage. De plus, les conditions météorologiques extrêmes, telles que les fortes pluies ou les périodes de sécheresse prolongées, affectent le rendement et la qualité des fourrages récoltés et des cultures. Lors des périodes de sécheresse, la qualité ou/et la disponibilité en herbe des prairies pâturées peut diminuer, rendant une alimentation complémentaire nécessaire. Les systèmes naisseurs plutôt basés sur l'herbe sont plus sensibles aux aléas climatiques et d'autant plus en élevage biologique.



CONTACT

- Idèle : elisabeth.castellan@idele.fr
- ILVO : maryline.lamerand@ilvo.vlaanderen.be
- CRA-W : a.lefevre@cra.wallonie.be



REFERENCES

- Spécialisations agricoles selon le règlement (CE) n° 1242/2008
- Statbel (statistiques de 2020)
- RA 2020



Crédits photos : ILVO et Idèle

Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne
Medegefinancierd door
de Europese Unie

inagro

ILVO

FRA

France - Wallonie - Vlaanderen

CIPF

TERRASOLIS

ILVO

FRA

AgriClimate

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Grand Est

Wallonie

